

Carcinoidul duodenal

D. Vasile, M. Grigoriu, Al. Ilco, G. Țenovici, I. Geogloman
Clinica Chirurgie I, Spitalul Universitar de Urgență București

Rezumat

Tumorile carcinoide duodenale sunt extrem de rare. Prezentăm două observații de carcinoid duodenal. Manifestarea clinică principală în ambele cazuri a fost hemoragia digestivă superioară însoțită de anemie severă. Tumorile au avut dimensiuni mari (2,5cm respectiv 6cm) și au fost evidențiate la endoscopia digestivă superioară. Prima observație a prezentat o metastază ganglionară iar a doua invazia masivă a pancreasului. În ambele cazuri diagnosticul a putut fi precizat numai postoperator prin histologie și imunohistochimie. În primul caz s-a practicat rezecția locală transduodenală, iar în al doilea duodenopancreatectomia cefalică. În primul caz, la șase luni postoperator s-a reintervenit practicându-se extirparea unei recidive tumorale retroduodenale (carcinoid) și gastrectomie totală pentru carcinom neuroendocrin. În ciuda aspectului lezional locoregional avansat, evoluția la distanță a fost bună. Ambele paciente sunt în viață la 42 și respectiv 15 luni postoperator. Tumorile carcinoide ale duodenului au evoluție lentă și impactul lor asupra supraviețuirii este neclar.
Cuvinte cheie: carcinoid duodenal, tumoră neuroendocrină

Correspondență: Dr. Dănuț Vasile, Clinica Chirurgie I, Etaj 6
Splaiul Independenței nr. 169, 050098 București, E-mail: danutvasiledr@yahoo.com