

Reconstrucția într-un timp în hipospadias

S. Ionescu, B. Andrei, S. Țîrlea, O. Amărieuței

Clinica de Chirurgie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie", București, România

Rezumat

Placa uretrală tubularizată (TIP) este tehnica chirurgicală folosită cel mai frecvent pentru formele comune de hipo-spadias. Studiul include 52 uretroplastii, realizate în perioada 2007-2010. S-a efectuat uretroplastie Mathieu în 12% din cazuri, Duplay în 88% din cazuri, iar artificul Snoodgrass a fost asociat în 82% din cazuri. Durata spitalizării a variat între 3-8 zile după intervenție. Au fost incluși în studiu 32 pacienți cu hipospadias distal, 8 cu hipospadias proximal și 12 cu meat situat în 1/3 medie a penisului. Pentru prevenirea fistulelor considerăm că este importantă realizarea unor suturi uretrale etanșe, interpunerea de țesut subcutanat între uretroplastie și sutura tegumentară, decalajul între sutura uretrală și cea cutanată. Incidența fistulelor după intervenția Duplay a fost mai mare decât după intervenția Mathieu, dar cazurile operate prin procedeul Duplay au fost mai dificile și mai numeroase. Complicațiile au fost mai frecvente în cazurile de hipo-spadias proximal decât distal, independent de tehnica chirurgicală adoptată, ca și procentul de reintervenții. Sunt prezentate în articol elemente de diagnostic, embriologie și etiopatogenie a hipospadiasului.

Cuvinte cheie: hipospadias, uretroplastie, copil 12 – 18 luni, fistulă

Correspondență:

Conf. Dr. Sebastian Ionescu

Clinica Chirurgie Pediatrică I

Spitalul Universitar de Urgență pentru Copii «M.S. Curie», București, România

Bd. C-tin Brâncoveanu, nr. 20, Sector 4

Tel: 021-4604260, Fax: 021-4601260

E-mail: nsionescu@yahoo.com