

Necroza cumarinică - complicație rară a terapiei anticoagulante orale

F. Graur, A. Szasz, H. Neagoș, A. Coțe, G. Tudorică, L. Furcea, A. Mureșan, M. Acalovschi, L. Petrov, C. Iancu, L. Vlad

Clinica Chirurgie III Cluj-Napoca

Rezumat

Necroza cumarinică este o entitate clinică rară, care apare la aproximativ 0,01 – 0,1% din pacienții care urmează tratament anticoagulant oral. Majoritatea cazurilor devin manifeste după 3-6 zile de tratament (deși au fost raportate cazuri cu debut la 15 ani de la inițierea terapiei anticoagulante), iar zonele afectate cu predilecție sunt sânii, coapsele și fesele, zone cu microcirculație bine dezvoltată. Primele acuze sunt paresteziile sau senzația de tensiune asociate cu apariția unei leziuni eritematoase la nivelul ariei afectate. Leziunile sunt bine demarcate, dureroase, fiind inițial eritematoase sau hemoragice, pentru ca ulterior să apară necroza pielii pe toată grosimea ei. Leziunile la debut pot regresa spontan odată cu întreruperea tratamentului, dar recurența necrozelor a fost raportată chiar fără reluarea terapiei anticoagulante orale în unele cazuri. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 55 de ani, aflată sub tratament cu anti-coagulante orale, care s-a prezentat în serviciul nostru cu leziuni de necroză cumarinică la nivelul regiunii deltoidiene drepte și la nivelul sânelui drept.

Cuvinte cheie: necroză cutanată, complicații hemoragice induse de cumarinice

Correspondență: Dr. Florin Graur, Clinica Chirurgie III

Str. Croitorilor nr. 19 – 21, Cluj-Napoca, E-mail: graurf@yahoo.com