

**Opțiuni de acoperire cu lambouri în escarele de decubit**

S. Nae, N. Antohi, C. Stîngu, V. Stan, S. Parasca

Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, București

Rezumat

În ciuda dezvoltării tehnicilor de reconstrucție în tratamentul escarelor de decubit, recidivele sunt încă frecvente, rata de succes rămânând variabilă. În perioada 2003 – 2007, în Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București, au fost operați 27 de pacienți care prezentau 45 de escare de decubit, dintre care 22 la nivel sacrat, 12 la nivel ischiatic și 11 la nivel trohanterian. Vârsta medie a pacienților a fost de 57,1 ani (limite 26, respectiv 82 de ani). Durata medie de urmărire postoperatorie a pacienților a fost de 6 luni (limite 2 luni – 2 ani). Au fost semnalate complicații la 18 dintre escare (40%). La 6 luni postoperator au fost notate recidive la 12 dintre escarele tratate (27%). În lucrare sunt prezentate detaliile referitoare la indicațiile, contraindicațiile, avantajele și dezavantajele diverselor opțiuni de acoperire, alături de datele din literatură. Este subliniată importanța acoperirii chirurgicale în reducerea morbidității, mortalității și costurilor tratamentului.

Cuvinte cheie: escare de decubit, acoperire cu lambou, reconstrucție tisulară, tratament chirurgical

Correspondență: Dr. Sorin Nae, Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, București, Calea Griviței nr. 218, Sector 1, București, Fax: 0318170921

E-mail: naesorin@yahoo.com, naedaniel@gmail.com