

Tumori carcinoide gastrointestinale: diagnostic și tratament

M. Stamatakos¹, K. Kontzoglou², C. Sargedis³, S. Tsaknaki¹, R. Iannescu¹, C. Safioleas¹, V. Kaitanidi⁴, M. Safioleas¹

¹4th Department of Surgery, University of Athens, School of Medicine, Attikon General Hospital, Athens, Greece

²2nd Department of Propaedeutic Surgery, University of Athens, School of Medicine, Laiko General Hospital, Athens, Greece

³Department of internal medicine, Ystad hospital, Sweden

⁴Department of Anaesthesiology, N Athinaion, Hospital, Athens, Greece

Rezumat

Tumorile carcinoide sunt proliferări maligne provenind din celule neuroendocrine, întâlnite obișnuit la nivelul tractului gastrointestinal, cu o frecvență de 64%, majoritatea interesând ileonul. Anumite sindroame genetice includ în fenotipul lor uneori, tumori carcinoide. Aceste neoplazii pot fi mai degrabă asimptomatice, deși uneori au manifestări zgomotoase. Tumorile carcinoide sunt diagnosticate tipic din cauza efectelor locale, ce apar într-un stadiu avansat de evoluție, sau simptomelor determinate de secreția de hormoni (sindrom carcinoid). Este necesară o mai bună cunoaștere a biologiei moleculare și comportamentului acestor tumori, astfel încât să fie diagnosticate precoce și tratate eficient.

Cuvinte cheie: afectare carcinoidă, celule neuroendocrine, sindrom carcinoid, carcinoidoză ileală

Corresponding author: Stamatakos Michael, MD, PhD.

Aigyptou 153, Ano Glyfada, Athens, 16561, Greece

Telephone number: 00306944133068

E-mail: mixalislak@gmail.com