

Metastazele septice ale supurațiilor de origine odontogenă

M. Juncar¹, A.R. Popa², T. Lung¹, F. Onișor¹

¹Clinica de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială I, Cluj Napoca, România

²Clinica Medicală II – Diabet, Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea, România

Rezumat

Infecțiile de origine odontogenă localizate la nivelul părților moi ale viscerocraniului sunt printre cele mai frecvente afecțiuni de la acest nivel. Dintre acestea, afecțiunile cu caracter difuz pot îmbrăca forme grave cu apariția de metastaze septice sistemice. În lucrarea de față se realizează un studiu a 7 cazuri de infecții difuze odontogene, metastazate la distanță. Au fost analizate modalitățile de apariție al metastazelor septice și tratamentul aplicat atât local cât și general. Extinderea la distanță a supurației a apărut la acei pacienți care prezentau fasciită necrozantă cervicală asociată unor afecțiuni imunosupresoare. Din cei 7 pacienți incluși în studiu 4 au prezentat diabet zaharat decompensat și obezitate. La toți cei 7 pacienți au fost decelate afecțiuni septice localizate la nivel mediastinal, iar în trei cazuri au apărut determinări septice hepatice. Tratamentul de elecție al acestor afecțiuni s-a dovedit a fi cel chirurgical asociat cu cel de susținere a stării generale, reechilibrarea constantelor homeostatice și antibacterian. Evoluția postoperatorie în cazul a 5 pacienți a fost favorabilă, iar în cazul a 2 pacienți a fost nefavorabilă cu instalarea insuficienței multiorganice și a decesului.

Cuvinte cheie: infecții odontogene, metastaze septice, fasciită necrozantă

Correspondență: Dr. Mihai Juncar
Str. Moșilor, Nr. 33, Cluj Napoca
e-mail: mihaijuncar@gmail.com