

Hematomul epidural de fosă posterioară

T. Papacocea¹, A. Papacocea², L. Dănăilă², R. Papacocea³, D. Ion³, A. Bădărău³, C. Ciornei³, M. Buraga³

¹Spitalul de Urgență "Sf. Pantelimon" București, România

²Institutul de Boli Cerebrovasculare București, România

³Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, România

Rezumat

Hematoamele epidurale de fosă posterioară sunt entități rare, al căror prognostic este întunecat de localizarea la acest nivel. Deoarece simptomatologia este adesea nespecifică sau relativ ștearsă, este necesară efectuarea de preferință a CT la internare. RMN nu aduce beneficii/informații suplimentare în majoritatea cazurilor. În funcție de sursa sângerării, viteza de instalare a simptomelor precum și gravitatea evoluției variază. Diagnosticul și intervenția chirurgicală imediată se impun în cazul hematoamelor cu efect de masă și leziuni asociate. În toate cazurile, la pacienții cu HED e necesară o monitorizare atentă deoarece pot evolua imprevizibil, se pot agrava rapid necesitând intervenția chirurgicală.

Cuvinte cheie: fosa posterioara, hematom epidural

Correspondență: Dr. Raluca Papacocea
Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila"
București, Bdul Eroilor Sanitari 8, sector 5, 050474
Email: rpapacocea@gmail.com