

**Perforațiile neulceroase ale duodenului: analiza a 23 de cazuri**

G. Osian, L. Vlad, C. Iancu, C. Răchieriu, C. Puia, N. Al Hajjar, L. Mocan, P.G. Cristea  
Clinica Chirurgie 3, Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, România

**Rezumat**

Perforațiile duodenale de cauză neulceroasă sunt o patologie rară și puțin studiată. Lucrarea de față analizează retrospectiv un lot de 23 pacienți, pe o perioadă de 10 ani (01.01.2000-31.12.2009) cu această patologie. Cauzele dominante au fost cele iatrogene (52,17 % post CPRE și 17,39% după endos-copie digestivă superioară). În lot apar și cauze rare ca și perforații tumorale, plăgi penetrante, ingestia de corpi străini. Leziunile variază de la perforații milimetrice, până la necroza totală a peretelui unui segment duodenal, fiind asociate deseori cu alte leziuni complexe. Mortalitatea globală a fost de 52,17%, mai redusă în cazul leziunilor post CPRE (40%). În general leziunile iatrogene sunt diagnosticate mai precoce (54,54% din leziunile post CPRE fiind operate în primele 24h), probabil oferind o șansă mai mare de supraviețuire. 43,47% din cazuri sunt operate în condițiile de sepsis sever, cu multiple insuficiențe de organ, aceasta agravând prognosticul. Uneori au fost necesare intervenții seriate (până la 8 în lotul nostru). În 26% din cazuri intervenția primară s-a rezumat la drenaj paraduodenal și/sau retroperitoneal, duodenorafie (6 cazuri-26%), de obicei sub protecția unei gastro-enteroanastomoze (4 cazuri-17,39%), duodenorafie pe tub de decompresie (26%), alteleori duodenorafii cu patch seros jejunal sau duodeno-jejunoanastomoze, asociind uneori drenajul biliar și jejunostomia de alimentație. Intervențiile în această patologie sunt grevate de o morbiditate importantă, cu o rată mare de reintervenții (30,4%).

Cuvinte cheie: duoden, perforații duodenale, CPRE

Correspondență: Gelu Osian  
Str. Croitorilor nr. 19-21, Cluj-Napoca  
Tel.: 0264-432022  
E-mail: geluosian@yahoo.com