

Condilomatoza gigantă perianală (boala Buschke-Löwenstein). Prezentare de caz și date din literatură

HS. Papiu¹, A. Dumnici¹, T. Olariu², M. Onita³, E. Hornung³, D. Goldis¹, G. Aiordachioae¹, V. Vasca¹

¹“Vasile Goldiș” Western University Arad, Department of Surgery, Romania

²“Vasile Goldiș” Western University Arad, ICU, Romania

³Department of Surgery, Arad City Hospital, Romania

Rezumat

Condilomatoza gigantă perineală, cunoscută ca boala Buschke-Löwenstein (BLT), este o afecțiune rară cu transmitere sexuală, ce afectează regiunea anogenitală. La acest nivel apare o formațiune conopidiformă cu creștere lentă, care spre deosebire de condilomul obișnuit este agresivă și distructivă local, degenerând malign în 40-60% din cazuri. Prezentăm un caz cu BLT malignizată, discuții pe marginea etiopatogeniei și tratamentului acestei boli, cu scopul de a sublinia câteva repere în managementul condilomatozei gigante perineale.

Concluzii: Pacientul cu BLT trebuie evaluat clinic-imagistic pentru a stabili gradul invaziei viscerale și astfel amplitudinea intervenției chirurgicale. Excizia largă a leziunilor, cu margini de siguranță negative histologic este opțiunea de elecție dacă nu este invadat canalul anal. Chirurgia mai radicală este rezervată cazurilor cu invazie viscerală dovedită. Excizia este obligatorie chiar în cazul condiloamelor mici, pentru a preveni evoluția lor către BLT.

Cuvinte cheie: condilomatoză gigantă, boala Buschke-Löwenstein, excizie perineală largă

Corresponding author: Horatiu Papiu MD, PhD

Municipal Hospital, Clinic of Surgery

Pta M.Viteazu 7/8, Arad, Romania

E-mail: horatiuspapiu@yahoo.com