

**Polipii inflamatori mioglandulari colorectali: o serie de șapte cazuri și revizuirea literaturii**

G. Becheanu, C. Gheorghe, M. Dumbravă, V. Șerban-Barbu, M. Diculescu

Gastroenterology and Hepatology Department, Fundeni Clinical Institute, Bucharest, România

**Rezumat**

**Introducere:** Polipul inflamator mioglandular reprezintă un tip de polip non-neoplazic distinct, cu localizarea cea mai frecventă la nivel distal, recto-sigmoidian. Polipul a fost descris pentru prima dată de Nakamura și colaboratorii săi, și prezintă câteva aspecte histologice particulare.

**Material și metodă:** Prezentăm o serie de șapte cazuri (doi pacienți de sex masculin și cinci de sex feminin) cu polipi mioglandulari cu localizări de la 15 la 40 cm de orificiul anal. Patru pacienți au prezentat sângerări rectale, ceilalți polipi fiind descoperiți incidental.

**Rezultate:** Dimensiunile polipilor au variat între 4-30 mm în diametrul maxim. Macroscopic, leziunile au prezentat o consistență fermă și o suprafață netedă, roșiatică. Examenul histologic al probelor prelevate a evidențiat glande de tip hiperplastic cu dilatații chistice izolate, proliferare neregulată de fibre musculare, o cantitate variabilă de țesut de granulație (de obicei minimă), fără leziuni evidente de displazie epitelială. Toți polipii au fost excizați endoscopic fără prezența de complicații ulterioare.

**Concluzii:** Polipii inflamatori mioglandulari sunt entități distincte histopatologice, dar cu o patogeneză incertă, care poate include un traumatism local al mucoasei, prolaps mucosal sau leziuni ischemice. Având o patologie benignă acest tip de polip poate fi rezecat endoscopic, tratamentul chirurgical fiind rezervat pentru rare cazuri selectate.

**Cuvinte cheie:** polip inflamator mioglandular, polip inflamator, polip colorectal, sindrom de prolaps mucosal, polip

Corresponding author: Gabriel Becheanu MD

C.P. 15 – 349, 053120 Bucharest, România

E-mail: gbecheanu@yahoo.com