

### **Hemoragiile digestive superioare postduodenopancreatectomii cefalice**

N. Al Hajjar<sup>1</sup>, T. Mureșan<sup>2</sup>, P. Boruah<sup>2</sup>, C. Iancu<sup>1</sup>, O. Bălă<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UMF "Iuliu Hațieganu", Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca, România

<sup>2</sup>Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca, România

#### Rezumat

Hemoragia digestivă superioară ca și complicație postoperatorie a duodenopancreatectomiei cefalice, s-a menținut constantă ca frecvență în ultimele decenii, în ciuda scăderii globale a incidenței mortalității postduodenopancreatectomie cefalică. Este a doua ca frecvență după fistulele anastomotice, însă mult mai frecvent letală, în special când pancreasul este anastomozat la stomac. Cazul prezentat este al unui pacient de 55 de ani, diagnosticat în clinica noastră cu ampulom vaterian, pentru care s-a practicat duodenopancreatectomie cefalică cu anastomoză pancreato-gastrică termino-laterală, hepatico-jejuno-anastomoză termino-laterală și gastro-jejuno-anastomoză termino-laterală pe ansă ascensionată transmezocolic. Evoluția post-operatorie a pacientului a fost marcată de două episoade de hemoragie digestivă superioară, primul fiind rezolvat prin relaparotomie, iar al doilea beneficiind de aportul endoscopiei. Pornind de la acest caz, vom analiza factorii de risc ai hemoragiilor digestive superioare postduodenopancreatectomie cefalică și modalitățile terapeutice, știut fiind că la ora actuală nu există un consens în această privință în rândul specialiștilor.

Cuvinte cheie: hemoragie digestivă superioară, duodeno-pancreatectomie cefalică, factori de risc, modalități terapeutice

#### Correspondență:

Dr. Nadim Al Hajjar

Clinica Chirurgie III

Str. Croitorilor, Nr. 19 - 21, Cluj Napoca, Cluj, Romania, 400162

E-mail: na\_hajjar@yahoo.com