

Considerații clinice și terapeutice asupra unui caz de tumora phyllodes benignă

G.R. Chebac, Șt. Chicoș, V. Ardeleanu

Clinica I-a Chirurgie Generală, Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați, România

Tumorile phyllodes mamare reprezintă o patologie destul de rar întâlnită, acestea putând fi: benigne, cu risc mare de malignizare (border-line) sau maligne. În proporție de peste 50% tumorile phyllodes sunt benigne și apar la femei în jurul vârstei de 45 de ani. Am dorit să prezentăm acest caz datorită unor particularități clinice pe care le-a prezentat, existând elemente atât pro benignitate cât și pro malignitate, conduita fiind total diferită în cele două cazuri, ceea ce a ridicat problema tratamentului ce urma să îl aplicăm. Vă prezentăm cazul unei paciente de 57 ani, care s-a internat pentru o tumoră mamară dreaptă, de aproximativ 50/40 mm, ce ocupa cadranele mamare inferioare, cu suprafața boselată și contur neregulat, cu zone de necroză și hemoragie, mobilă pe peretele toracic, cu adenopatie axilară homolaterală, în grupul latero-toracic, de 1/2 cm., mobilă, cu aspect clinic netumoral. Tumora a apărut în urmă cu aproximativ 1-2 ani, dar, s-a dezvoltat foarte mult în ultimele 2 luni, când au apărut zonele de necroză; cu 3-4 zile înaintea prezentării la medic au apărut și sângerări. Intraoperator, tumora era imobilă față de planul profund, având caracter de invazivitate, iar ganglionii axilari erau conglomerati, sugerând infiltrarea neoplazică. Examenul histopatologic postoperator cu preparare la parafină, a evidențiat prezența unui adenomixio-fibrom, cu zone parcelare de necroză, cu infiltrat inflamator. Biopsiile recoltate din ganglionii axilari au evidențiat adenopatie satelită cu caracter inflamator.

Cuvinte cheie: tumoră, border-line, phyllodes

Correspondență: Dr. Chebac Gica Rumina
Clinica I-a Chirurgie Generală
Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei", Galați, România
E-mail: gicachebac@yahoo.com