

Rezultatele extinderii indicațiilor clasice ale histerectomiei vaginale pentru patologie uterină benignă

A. Ursuleanu^{1,2}, O. Nicodin³, I. Gussi², N. Niculescu³, Gh. Costăchescu¹

¹Department of Obstetrics & Gynecology II, Cuza Voda Hospital, UMF "Gr.T. Popa" Iași, Romania

²Department of Obstetrics & Gynecology, Cantacuzino Hospital, UMF "Carol Davila" Bucharest, Romania

³Department of Gynecology, University Emergency Central Military Hospital "Dr. Carol Davila" Bucharest, Romania

Rezumat

Obiective: compararea rezultatelor a două abordări chirurgicale; una dintre acestea constă în respectarea indicațiilor și contra-indicațiilor clasice ale histerectomiei vaginale (VH), iar cealaltă presupune lărgirea indicațiilor VH și reducerea contraindicațiilor prin utilizarea VH în cazurile cu dimensiuni mari ale uterului, la nulipare și la paciențe cu istoric de operație cezariană.

Material și metodă: Studiul prospectiv a inclus 816 paciențe cu patologie uterină benignă. La 465 de paciențe s-au aplicat indicațiile clasice ale VH, iar la 351 VH a fost utilizată ca primă alegere, încercându-se surmontarea contraindicațiilor clasice ale VH.

Rezultate: Prin extinderea indicațiilor clasice ale VH s-au obținut beneficii importante și anume reducerea timpului operator și scurtarea duratei de spitalizare. Nu s-au înregistrat diferențe semnificative în ceea ce privește sângerarea intra- și post-operatorie sau complicațiile majore.

Concluzii: Extinderea indicațiilor clasice ale VH aduce beneficii importante fără o creștere a incidenței complicațiilor majore.

Cuvinte cheie: histerectomie vaginală, histerectomie abdominală, histerectomie minim invazivă

Corresponding author: Alina Ursuleanu, MD

UMF "Gr.T. Popa" Iasi, Romania

E-mail: alina.ursuleanu@yahoo.com