

Colecistectomia laparoscopică în tratamentul colecistitei acute – posibilități și limite

E. Suliman, R. Palade

Surgical Department I, Emergency University Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Studiul a analizat un lot de 1402 C.A., operate în Clinica I Chirurgie S.U.U.B., în perioada 1993-2010. C.L. a fost posibilă în 90% din cazuri, iar conversia la chirurgia deschisă a fost de 10%. Sunt precizate cauzele care au determinat conversia (plastronul pericolecistic – 49%, orientarea anatomică neclară – 46,5%, hemoragia – 9,7%, leziunea iatrogenă a C.B.P. – 0,23%, etc.). Analiza statistică a evidențiat că sexul masculin, grupele de vârstă peste 50 ani, C.A. gangrenoasă și plastronul fibros au reprezentat factori de risc în finalizarea C.L. Reintervenițiile s-au realizat la 20 de bolnavi (1,4%). Mortalitatea postoperatorie a fost zero.

Cuvinte cheie: colecistita acută, colecistectomia laparoscopică, conversia la chirurgia deschisă

Corresponding author: Emel Suliman, MD

Surgical Department I, Emergency University Hospital, Bucharest, Romania

E-mail: emel_suliman@yahoo.com