

Tratamentul chirurgical al incontinenței urinare la bărbat prin suspensie uretrală transobturatorie

O. Bratu¹, D. Mischianu¹, S. Constantinoiu²

¹Department of Urology, Emergency University Central Military Hospital “Dr. Carol Davila”, Bucharest, Romania

²University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, General and Esophageal Surgery, “Sf. Maria” Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: Incontinența urinară reprezintă pierderea involuntară de urină pe uretră și este o problemă majoră de sănătate în întreaga lume, mai ales prin implicațiile psiho-sociale pe care le determină. Din punct de vedere chirurgical, se impune tratamentul incontinenței urinare la bărbat în special postoperator și anume după prostatectomia radicală retropubică, transuretro-rezecția sau vaporizarea prostatei, incizia colului vezical etc.

Tehnică: Tehnica chirurgicală este similară cu cea folosită pentru incontinența urinară la femei, respectiv TOT. Plasele sau benzile utilizate sunt de polipropilenă, identice cu cele folosite la femei sau speciale pentru incontinența urinară la bărbat. Maniera de introducere transobturatorie a acelor aplicatoare poate fi “in-out” sau “out-in”, în funcție de obișnuința operatorului.

Rezultate: Recuperarea postoperatorie a fost rapidă și în general fără complicații majore. Cateterul uretro-vezical s-a suprimat imediat post-procedură sau la 24 de ore postoperator, iar externarea pacienților s-a făcut după 48-72 de ore de la intervenția chirurgicală. Am observat ameliorarea incontinenței urinare încă din primele zile postoperator, iar simptomatologia a dispărut complet la 30 de zile postoperator la 80% din cazuri.

Complicații: Complicațiile intraoperatorii sunt minime și pot fi datorate leziunilor vasculare, uretrale sau vezicale, dar pot fi evitate în mâini experimentate. Tardiv, în cazuri rare, pot să apară rețelul sau ruptura meșei sau eroziuni ale uretrei.

Concluzii: Tehnica suspensiei uretrale transobturatorii folosită în tratamentul incontinenței urinare la bărbat s-a dovedit a fi eficientă. Procedeu este puțin invaziv, tehnic facil și relativ scurt ca durată a intervenției. Durata spitalizării este redusă, ceea ce face ca acest procedeu să fie eficient și din punct de vedere economic.

Cuvinte cheie: incontinență, transobturator, suspensie uretrală, post-prostatectomie, meșă

Corresponding author: Assist. Prof. Bratu Ovidiu, MD, PhD

University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”

Emergency University Central Military Hospital “Dr. Carol Davila”

Urology Ward

M. Vulcanescu street, no. 88, Bucharest

E-mail: ovi78doc@yahoo.com