

Sindromul de furt coronaro-subclavicular tratat prin by-pass carotido-subclavicular

D. Bindea^{1,3}, A. Todoran¹, T. Mihai¹, C. Ober², A. Iancu^{2,3}

¹Clinic of Cardiovascular Surgery, "Niculae Stăncioiu" Heart Institute, Cluj-Napoca, Romania

²Clinic of Cardiology, "Niculae Stăncioiu" Heart Institute, Cluj-Napoca, Romania

³University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca, Romania

Rezumat

Sindromul de furt coronaro-subclavicular reprezintă o entitate clinică rară datorată afectării aterosclerotice a originii arterei subclavii la pacienții coronarieni operați la care s-a utilizat artera mamară internă. Această complicație determină apariția fluxului retrograd la nivelul arterei mamară și reapariția ischemiei miocardice. Opțiunile terapeutice sunt angioplastia și stentarea arterei subclavii, sau, în cazuri de ocluzie a acesteia, tratamentul chirurgical. Acest caz prezintă realizarea unui by-pass carotido-subclavicular pentru tratamentul sindromului de furt coronaro-subclavicular, datorat ocluziei arterei subclaviculare stângi.

Cuvinte cheie: stenoză arteră subclavie, sindrom de furt coronaro-subclavicular, by-pass carotido-subclavicular

Corresponding author: Dan Bindea, MD

"Niculae Stăncioiu" Heart Institute

Clinic of Cardiovascular Surgery, Cluj-Napoca

Moșilor Street, no. 19-21, 400001, Romania

E-mail: bindea_dan_ch@yahoo.com