

Apendicectomie laparoscopică transombilicală E – NOTES

F. Graur^{1,2}, R. Elisei², N. Al-Hajjar^{1,2}

¹University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, Romania

²Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology “Prof. O. Fodor”, Cluj-Napoca, Romania

Rezumat

Prezentăm un caz de apendicectomie laparoscopică transombilicală E – NOTES (Embryonic Natural Orifice Transumbilical Endoscopic Surgery). O pacientă în vârstă de 17 ani se prezintă în serviciul nostru unde în urma ultrasonografiei abdominale și a examenului clinic amănunțit se stabilește diagnosticul de apendicită cronică și se recomandă tratament chirurgical. Simptomatologia debutează insidios în urmă cu 4 luni prin dureri abdominale difuze, care s-au localizat ulterior în fosa iliacă dreaptă însoțite de inapetență, grețuri și vărsături. Sub anestezie generală se realizează pneumoperitoneul. Printr-o singură incizie ombilicală de 10 mm lungime se introduc în cavitatea peritoneala 3 trocare de 5 mm. La explorare s-a evidențiat apendicele cecal turgescent și edemațiat. După ligatura și secționarea mezoapendicelui cu pensa LigaSure se ligaturează baza apendicelui cu 2 noduri Roeder și se secționează distal cu pensa LigaSure. Se plasează un dren la nivelul fundului de sac Douglas. Durata intervenției a fost de 60 de minute. Nu au fost complicații intra și postoperatorii. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, iar pacienta a fost externată în ziua 4 postoperator. Evaluarea pacientei în primele 2 luni de la intervenția chirurgicală evidențiază dispariția simptomatologiei, precum și faptul că cicatricea postoperatorie este ascunsă în cicatricea ombilicală.

Cuvinte cheie: apendicectomie SILS, apendicectomie E-NOTES, apendicectomie laparoscopică, apendicectomie transombilicală

Corresponding author: Nadim Al-Hajjar, MD

Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology “Prof. O. Fodor”

19-21 Croitorilor Street, Cluj-Napoca, Romania

E-mail: dr_nadim_alhajjar@yahoo.com