

Lipomatoza multiplă benignă simetrică - diagnostic diferențial al obezității

V. Ardeleanu^{1,2}, S. Chicos¹, C. Georgescu¹, D. Tutunaru¹

¹Emergency Clinical Hospital "Saint Andrew the Apostle" First Surgery Clinic, Galați, Romania

²"Lower Danube" University, Faculty of Medicine and Pharmacy, Galați, Romania

Rezumat

Boala Madelung sau lipomatoza simetrică benignă (BSL), este o afecțiune rară, caracterizată de creșterea difuză, nedureroasă și progresivă de lipoame neîncapsulate simetrice. Etiologia acestei maladii rămâne necunoscută, deși în literatura de specialitate această maladie a fost asociată cu consumul abuziv de alcool și nicotină, cu tulburări metabolice și cu unele tumori maligne. Se presupune că ar exista o predispoziție genetică pentru această maladie. Conduita terapeutică în asemenea cazuri constă în ablația chirurgicală a lipoamelor, de cele mai multe ori în mai multe ședințe, însă frecvent urmat de recidivă. Cu toate acestea, ablația chirurgicală a acestor lipoame poate oferi pacientului o funcționalitate satisfăcătoare și rezultate cosmetice. Diagnosticul diferențial se face cu obezitatea morbidă, sindromul Cushing, angioliipomatoză, lipoamele încapsulate, neurofibromatoza, liposarcomul mixoid, limfoame, boli ale glandelor salivare, sindromul Frölich și lipomatoza la pacienții infectați cu HIV. Lucrarea de față prezintă cazul unui bărbat de 55 de ani, care prezenta mai multe mase lipomatoase voluminoase, dispuse simetric pe fața anterioară și dorsală a trunchiului, și câteva lipoame mai mici la nivelul membrelor superioare și inferioare. Tratamentul a constat în rezecția acestor lipoame în mai multe ședințe, fără recidivă la un an după ultima operație.

Cuvinte cheie: lipomatoza simetrică benignă, sindromul Launois-Bensaude, tratament chirurgical, alcoolism

Corresponding author: Georgescu Costinela, MD

Emergency Clinic Hospital "Saint Apostol Andrei" First Surgery Clinic, Galați
Romania

E-mail: costinelag@gmail.com