

Tratamentul laparoscopic al unui abces hepatic subcapsular secundar perforației vezicii biliare: raportarea unui caz

D. Cristian, F. Grama, T. Burcoș

Department of General Surgery, Colțea Hospital, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Prezentăm un caz rar de perforație a vezicii biliare, de tip Niemeier II, apărută ca o complicație a colecistitei acute litiazice. Un pacient în vârstă de 76 de ani s-a internat în clinica noastră cu diagnosticul prezumtiv de colecistită acută litiazică. Examenul computer tomograf a evidențiat o colecție subcapsulară dezvoltată pe fața viscerală a lobului drept hepatic. Aceasta comunica printr-o bandă hipodensă subțire cu canalul cistic, distal de un calcul cistic impactat. Laparoscopia diagnostică a evidențiat un abces hepatic subcapsular secundar perforației veziculei biliare. Colecistectomia și tratamentul abcesului s-au realizat integral pe cale laparoscopică. Articolul demonstrează că, în această situație, abordul laparoscopic poate fi sigur și fezabil pentru tratamentul atât al cauzei cât și al complicației. Diagnosticul precoce și abordul miniminvaziv reprezintă cheia rezolvării acestei rarități.

Cuvinte cheie: perforație tip II vezică biliară, abces hepatic subcapsular, colecistită acută litiazică

Corresponding author: Florin Grama MD, PhD student

Colțea Hospital, General Surgery Department

1, I.C. Brătianu street, district 3, 030171, Bucharest, Romania

E-mail: florin_gramma@yahoo.com