

Multiple fețe ale carcinoamelor mamare triplu negative

T. Potecă¹, M. Comănescu², A. Potecă¹, C. Cocosila³

¹"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania

²"Victor Babeș" National Institute of Research Development Bucharest, Romania

³"Bagdasar Arseni" Hospital Bucharest, Romania

Rezumat

Tumorile de sân triplu negative sunt caracterizate de lipsa de expresie imunohistochimică pentru receptorii hormonali (ER și PgR) și Her2/neu. Imunofenotipul este, în general, asociat cu vârstă tânără și agresivitate crescută, frecvența lor în literatură variind între 10 și 20%. În studiul nostru am realizat o clasificare retrospectivă a tumorilor mamare triplu negativ, pentru a evidenția spectrul larg de leziuni care pot îmbrățișa acest fenotip foarte special. Parametrii evaluați au inclus vârsta, mărimea tumorii și aspectul macroscopic, subtipul histologic și asocierea cu componenta in situ, gradul de diferențiere a tumorii (pleomorfism nuclear, numărul de mitoze, formarea tubulilor), prezența nodulilor limfatici sau a metastazelor la distanță. Carcinoamele de sân triplu negative reprezintă un anumit subtip de tumori, dar agresivitatea lor descrisă în literatură se aplică numai la unele subtipuri histologice. Este foarte importantă corelarea caracteristicilor histologice și a expresiei fenotipice.

Cuvinte cheie: cancer de sân, triplu negativ, clasificare

Corresponding author: Maria Comănescu, MD

"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy Bucharest, Romania

E-mail: mariacomanescu@yahoo.com