

Axilopexia

V. Sârbu¹, R. Melihov², O. Unc², D. Costea², M. Pundiche², R. Ilie³, V. Truta³

¹Ovidius University, "Medstar 2000" General Surgery Clinic, Constanța, Romania

²Ovidius University, General Surgery Department of the Emergency Clinical County Hospital
Constanța, Romania

³Municipal Hospital Mangalia, Romania

Rezumat

Lucrarea prezentă este o redare a tehnicii noastre de axilopexie utilizată după evidarea limfoganglionară a axilei la un lot de 29 de bolnave. Intervențiile s-au efectuat pentru cancer mamar. Tehnica s-a aplicat după mastectomie radicală modificată Madden sau după quadrantectomie pentru tumoile din cadranele interne ale glandei mamare. S-au urmărit, comparativ cu un lot martor de 30 de cazuri, durata limforagiei, durata menținerii tuburilor de dren și prezența/absența altor complicații locale. Deasemena s-a urmărit scurtarea timpului de reluarea a terapiei adjuvante oncologice. Toți acești parametri s-au ameliorat prin efectuarea axilopexiei.

Cuvinte cheie: axilopexie, limforagie, cancer mamar

Corresponding author: Prof. Univ. Dr. Vasile Sârbu
Ovidius University Constanța, Romania
E-mail: vasilesarbu_cta@yahoo.com