

Trei cazuri de hidatidoză primară a mușchiului fesier: experiența noastră în aspectul clinic, de diagnostic și de tratament

G.K. Charalambous^{1,2}, V.A. Katergiannakis¹, A.J. Manouras¹

¹First Propaedeutic Surgical Department, Athens University, Medical School, Greece

²Emergency Department, Hippocratio Hospital Athens, Greece

Rezumat

Sunt descrise trei cazuri de hidatidoză primară a mușchiului fesier tratate în departamentul nostru în ultimii 10 ani. Primul a fost inițial interpretat ca hernie perineală sau sciatică. Diagnosticul a fost pus în sala de operație. În al doilea caz, am inclus în diagnosticul nostru diferențial posibilitatea de implicare parazitară cu localizări neobișnuite. Diagnosticul a fost confirmat prin ecografie urmată de tomografie computerizată (CT), cu scopul de a exclude implicarea ficatului și a pulmonului. Ultimul pacient a fost operat inițial în altă parte, dar în cele din urmă a venit la noi pentru a-i fi tratate complicațiile. La ani de la operație nu a existat nici o dovadă de recurență la vreunul dintre pacienți, ultimul suferind însă în continuare de fasciita recurentă și sciatică.

Cuvinte cheie: hidatidoză primară, mușchiul fesier

Corresponding author: George K. Charalambous MD, MSc, PhD
15, Pontoirakleias, 11527 Athens, Greece
E-mail: drcharalambous@yahoo.gr