

## **Este tratamentul chirurgical o metodă eficientă de ameliorare a durerii la pacienții cu hemangiom hepatic?**

E.G. Dumlu<sup>1</sup>, O. Abbasoğlu<sup>2</sup>, E. Hamaloğlu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of General Surgery, Atatürk Research and Training Hospital, Ankara, Turkey

<sup>2</sup>Department of General Surgery, Hacettepe University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

### **Rezumat**

*Scop:* Tratamentul tradițional al hemangioamelor hepatice este cel chirurgical. La momentul actual se pune însă problema dacă managementul chirurgical al hemangioamelor aduce beneficii suficiente pacienților. În cadrul acestui studiu am evaluat eficacitatea chirurgiei la pacienții cu hemangiom hepatic.

*Metode:* Patruzeci și doi de pacienți supuși intervenției chirurgicale pentru hemangiom hepatic au fost evaluați retrospectiv și intervievați.

*Rezultate:* Populația studiată a inclus 36 de femei și 6 bărbați, cu vârste cuprinse între 26 și 65 de ani (vârsta medie 47,8±8,7 ani). Durata medie de internare a fost de 6 zile (limite 3 - 59 zile). Intervalul mediu de timp trecut de la momentul operației a fost de 50 de luni (limite 0-120 luni). S-a remarcat o scădere semnificativă statistic a estimării cantitative și calitative a durerii pe scala durerii ( $p<0.05$ ). Postoperator, durerea nu a încetat la 10 pacienți (ulcer peptic necesitând tratament medical la 4 pacienți, colelitiază la 4 pacienți și nefrolitiază la 2 pacienți).

*Concluzii:* Pacienții cu hemangioame cavernoase hepatice necesitând tratament chirurgical prezintă beneficii semnificative în ceea ce privește ameliorarea durerii postoperator. Absența ameliorării durerii după operație la anumiți pacienți poate fi datorată unor comorbidități.

**Cuvinte cheie:** ficat, hemangiom cavernos, chirurgie, estimarea durerii

Corresponding author: Ersin Gürkan Dumlu, MD  
Ataturk Research and Training Hospital  
Department of General Surgery  
Bilkent, Ankara, Turkey  
E-mail: gurkandumlu@gmail.com