

Anastomoză ileo-anală cu rezervor ileal în J perforat - prezentare de caz

U. Dogan¹, B. Dogan², M. Habibi¹, M. K. Erol², B. Mayir¹, A. Aslaner¹, N. Bulbuler¹

¹General Surgery Department, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

²Eye Department, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

Rezumat

Un pacient în vârstă de 34 ani, supus în urmă cu 5 ani unei operații de colectomie totală cu anastomoză ileo-anală cu rezervor ileal în J, ca urmare a unui diagnostic de polipoză adenomatoasă familială, a fost internat în regim de urgență pentru acuze de durere abdominală intensă datând de aproximativ 4 zile. Examenul fizic a revelat durere difuză la palparea abdominală, în mod special în cadranele inferioare. Ecografia abdominală a decelat prezența de lichid între ansele intestinale, iar examenul CT a decelat niveluri hidroaerice libere în abdomen. În timpul laparotomiei efectuate pentru lărgirea anastomozei ileo-anale la aproximativ 12 cm diametru, o perforație de 2 mm a fost decelată la nivelul capătului orb al anastomozei. A fost rezolvată prioritar perforația, după care s-a efectuat ileostomă de protecție. În timpul endoscopiei post-operatorii nu s-au observat obstrucție sau stază, dar a fost decelată inflamație la nivelul rezervorului ileal în J. Pacientul a fost externat la 20 de zile de la intervenția chirurgicală și urmărit postoperator endoscopic. Rezultatele endoscopiei efectuate la 6 luni de la operație au fost normale.

Cuvinte cheie: polipoză adenomatoasă familială, anastomoză ileo-anală, perforație intestinală, rezervor ileal în J, inflamația rezervorului ileal

Corresponding author: Mani Habibi, M.D.

Department of General Surgery
Antalya Training and Research Hospital
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Varlık Mh
07050 Muratpaşa/Antalya, Turkey
E-mail: manihabibi@gmail.com