

Tratamentul postnatal al peritonitei meconiale diagnosticată antenatal

S. Ionescu¹, B. Andrei¹, M. Oancea¹, E. Licsandru¹, M. Ivanov¹, V. Marcu², R. Popa-Stanila³, M. Mocanu¹

¹Department of Pediatric Surgery, "Marie S. Curie" Emergency Children Hospital, Bucharest, Romania

²Department of Radiology and Medical Imaging, "Marie S. Curie" Emergency Children Hospital, Bucharest, Romania

³"Imogen Research Centre", Cluj-Napoca, Romania

Rezumat

Peritonita meconială este o afecțiune prenatală rară care duce la o rată substanțială a morbidității și mortalității neonatale. Semnele caracteristice evidențiate prin ecografiile prenatale și postnatale includ: calcificări intraabdominale, ascita, polihidramnios, pseudochistul meconial, mase ecogenice și dilatarea intestinului sau obstrucție intestinală. Stabilirea clară a tratamentului postnatal și a prognosticului sunt dificile datorită heterogenității rezultatelor obținute prin ecografii. Scopul studiului este de a determina modul în care diagnosticul prenatal de peritonită meconială este asociat cu managementul perinatal și evoluția ulterioară. Rezultatele clinice sunt diferite în funcție de prezența diagnosticului antenatal de peritonită meconială și de forma acesteia, care poate fi ușoară sau severă. Tratamentul chirurgical și managementul peritonitei meconiale depinde de starea clinică la prezentarea nou-născutului. Peritonita meconială diagnosticată prenatal diferă de cea a nou-născutului, nu doar prin rata de mortalitate cât și prin reducerea morbidității și un prognostic mult mai bun.

Cuvinte cheie: peritonită meconială, chirurgie neonatală, diagnostic prenatal