

### **Țesut mamar accesoriu axilar bilateral evidențiat de sarcină**

Florin Grama, Ștefan Voiculescu, Ema Vîrğa, Traean Burcoș, Daniel Cristian  
General Surgery Department, Colțea Clinical Hospital, Bucharest, Romania

#### **Rezumat**

Ilustrăm cazul rar al unei paciente de 28 ani ce s-a prezentat cu două formațiuni tumorale axilare bilaterale ce au apărut în timpul sarcinii, crescând apoi progresiv în dimensiuni. Examenul local a evidențiat două formațiuni de 5/3/5 cm fiecare cu caracteristici clinice de benignitate, dezvoltate la nivelul extensiei axilare a glandei mamare. În timpul lactației, un lichid similar laptelui s-a evacuat printr-un mamelon rudimidar, maroniu, localizat în centrul fiecărei formațiuni. La 1 an de la naștere, rezonanța magnetică nucleară e evidențiată la nivelul celor două mase tumorale țesut mamar accesoriu cu același semnal ca și glanda eutopică de care se delimitează. Din motive estetice și din cauza riscului de a dezvolta tumori benigne sau maligne, țesutul mamar ectopic a fost excizat chirurgical. Examenul histologic a evidențiat țesut mamar glandular normal.

**Cuvinte cheie:** țesut mamar accesoriu, polimastie, axilă, sarcină