

Torsiunea axială și infarctizarea diverticulului Meckel în trimestrul 3 de sarcină

Radu Botezatu¹, Radu Marian², Nicolae Gica¹, George Iancu^{1,3}, Gheorghe Peltecu^{1,3},
Anca Maria Panaitescu^{1,3}

¹Filantropia Clinical Hospital Bucharest, Romania

²Emergency Clinical Hospital Bucharest, Romania

³"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Diverticulul Meckel este o malformație congenitală care se poate complica sau rămâne asimptomatic pe parcursul vieții. În timpul sarcinii însă, infecția diverticulului poate deveni o complicație importantă. Necroza diverticulară și perforația sunt complicații care cresc morbiditatea maternă și fetală în sarcină. Raritatea afecțiunii și modificările fiziologice de sarcină fac diagnosticul dificil. Prezentăm cazul unei gangrene a diverticulului Meckel în trimestrul trei de sarcină, caz cu simptomatologie atipică datorită sarcinii avansate în care balanța risc-beneficiu a fost atent evaluată pe de o parte datorită riscului infecțios în cazul expectativei și pe cealaltă parte, a riscului și arsenalului de complicații date de nașterea prematură iatrogenă înainte de termen. Rezultatele au fost favorabile atât pentru mamă cât și pentru nou-născut.

Cuvinte cheie: diverticul Meckel, sarcină, torsiune axială, gangrenă