

Diverticulita jejunală care imită perforarea intestinului subțire: prezentare de caz și analiza literaturii

Athanasios Syllaios¹, Antonios Koutras², Prokopis A. Zotos³, Evangelia Triantafyllou⁴, Nikolaos Bourganos¹, Sofia Koura², Aristotelis Liakos¹

¹Department of Surgery, General Hospital of Lamia, Greece

²Department of Obstetrics and Gynecology, General Hospital of Athens 'Laiko', Athens, Greece

³Department of Surgery, General Military Hospital, Larisa, Greece

⁴Department of Surgery, Mpodosakeio Hospital, Ptolemaida, Greece

Rezumat

Diverticulita jejunală este o afecțiune rară, cu prevalență ridicată la pacienții cu vârsta între 60-70 de ani. Diverticulul jejunal este considerat ca o descoperire accidentală, dar care poate avea complicații ca de exemplu diverticulita, perforație, abces, peritonită generalizată, fistulă, obstrucție și sângerare. Stabilirea unui diagnostic rămâne în continuare o provocare. Medicii trebuie să fie conștienți de existența acestora și suspiciunea clinică trebuie menționată, mai ales în condițiile unei dureri abdominale acute, caz în care diverticulita jejunală trebuie inclusă în diagnosticul diferențial. O cantitate redusă de aer adiacent intestinului subțire poate crea confuzie fiind diagnosticat greșit ca perforație a intestinului subțire, când de fapt poate fi rezultatul inflamației fără macroperforație sau complicații. Acest lucru poate schimba strategia terapeutică spre una mai puțin agresivă, spre tratament conservator. Prezentăm cazul unui pacient care se prezintă la serviciul de urgență cu durere abdominală acută, semne de peritonită; o cantitate mică de aer extraluminal și diverticulita jejunală fără perforație au fost diagnosticate în cadrul laparotomiei și după analiza literaturii de specialitate.

Cuvinte cheie: diverticulită jejunală, perforație, durere abdominală acută, diagnostic diferențial, intestin subțire