

Incizie transversală supraclaviculară unică pentru disecții ganglionare radicale

Andy Petroianu

Department of Surgery of the Medical School of the Federal University of Minas Gerais, Brazil

Rezumat

Introducere: Descrierea linfadenectomiei cervicale radicală unilaterale și respectiv bilaterale modificate care oferă acces la glanda tiroidă și la toate stațiile limfoganglionare ale gâtului printr-o incizie supraclaviculară transversală unică.

Metodă: Limfadenectomia cervicală radicală uni-/bilaterală modificată prin incizie supraclaviculară transversală unică a fost efectuată la 10 pacienți cu diagnosticul de carcinom tiroidian sau respectiv labial. Toate nodurile limfatice cervicale anterioare și laterale au fost rezecate în bloc cu țesutul fibro-lardaceu din vecinătate, preservând atât ambii mușchi sternocleidomastoidieni, cât și ambele vene jugulare interne. În cazurile de carcinom tiroidian s-a practicat tiroidectomie totală în cursul aceleiași intervenții chirurgicale.

Rezultate: Această procedură chirurgicală și-a demonstrat fezabilitatea la toți pacienții, în condițiile respectării principiilor oncologice. Nu s-au înregistrat complicații intra-/postoperatorii.

Concluzii: Incizia supraclaviculară transversală unică permite expunerea adecvată a tuturor nodurilor limfatice cervicale, diminuând la minim riscul de complicații legate de incizie cât și riscul de lezare a țesuturilor. Această incizie este indicată în cazurile de linfadenectomie radicală cervicală însă poate fi practică și în cazurile în care sunt efectuate alte proceduri chirurgicale la nivel cervical.

Cuvinte cheie: linfadenectomie cervicală, incizie transversală unică, linfadenectomie cervicală modificată, vindecare cosmetică