

Factori predispozanți pentru apariția hipertensiunii intra-abdominale în urma curei chirurgicale a herniilor incizionale

Marius Coțofană^{1,2}, Florentina Mușat^{1,2}, Dan Nicolae Păduraru^{1,2}, Octavian Andronic^{1,2},
Alexandra Bolocan^{1,2}, Daniel Ion^{1,2}

¹The University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila", Bucharest, Romania

²The Emergency University Hospital of Bucharest, Romania

Rezumat

Acest review de literatură își propune să sintetizeze factorii de risc care predispun la apariția hipertensiunii intraabdominale în urma curei chirurgicale a herniilor incizionale. Cercetarea noastră a utilizat platformele de cercetare Web of Science, Scopus și PubMed și a utilizat ca formulă de căutare: ("Intraabdominal hypertension" OR "intraabdominal pressure" OR "abdominal compartment syndrome") AND "risk factors" AND "incisional hernia". Filtrarea rezultatelor s-a realizat după următoarele criterii: limba: engleză, publish year > 2000 și acces: in extenso. În acest context, am ales să împărțim factorii de risc pentru creșterea PIA în următoarele categorii: cei legați de habitusul și antropometria corpului; cei asociați cu prezența comorbidităților; cei legați de caracteristicile defectului (eventrației) din peretele abdominal; cei asociați actului chirurgical. Printre cei mai importanți pot fi amintiți: indicele de masă corporală, BPOC, eventrațiile de dimensiuni mari cu pierderea dreptului la domiciliu, tehnica chirurgicală utilizată, timpul operator prelungit și tentative repetate de închidere a defectului.

Cuvinte cheie: hipertensiune intraabdominală, hernie incizională, complicațiile reconstrucției peretelui abdominal, factori de risc