

### **Hidatidoza pulmonară - procedeu chirurgical abandonat**

Claudiu Eduard Nistor<sup>1</sup>, Sorin Berbece<sup>2</sup>, Olivia Batog<sup>1</sup>, Adrian Ciuche<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dr. Carol Davila Central Military Emergency University Hospital, Thoracic Surgery, Bucharest, Romania

<sup>2</sup>Dunărea de Jos University, Faculty of Medicine and Pharmacy, Galați, Romania

### **Rezumat**

De-a lungul anilor, hidatidoza, ca entitate patologică medico-chirurgicală, a fost analizată de mulți chirurghi ce au încercat să identifice metoda optimă de tratament prin care să limiteze cât mai mult leziunile parenchimului pulmonar, aducând cât mai multe beneficii posibile pacienților. În acest articol, autorii încearcă să aducă în centrul atenției un procedeu chirurgical abandonat datorită posibilelor complicații dar care a fost adaptat perfect în cazul descris mai jos. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 59 de ani, fără antecedente patologice semnificative, care avea o simptomatologie minimă nespecifică și la care s-a utilizat cu succes procedeul chirurgical Perez-Fontana în tratamentul hidatidozei pulmonare.

**Cuvinte cheie:** echinococcus, chist hidatic pulmonar, Perez-Fontana