

Rolul markerilor inflamatori în prezicerea rezecabilității adenocarcinomului ductal pancreatic

Christos Agalianos¹, Nikolaos Gouvas², Dimitrios K. Manatakis¹, Ioannis Sideris³, Ioannis Passas³, Christos Dervenis³

¹Department of Surgery, Athens Naval and Veterans Hospital, Athens, Greece

²Department of Surgery, Medical School, University of Cyprus

³Department of Surgical Oncology and Hepato-Pancreatic-Biliary Surgery, Metropolitan Hospital of Athens, Greece

Rezumat

Context: Adenocarcinomul pancreatic încă este considerat unul dintre cele mai agresive cancere, cu procente scăzute de rezecabilitate, în ciuda progreselor diagnostice recente. Evaluarea markerilor inflamatori preoperatori poate crește ratele de rezecabilitate.

Metode: Studiul este unicentric, s-a desfășurat pe o perioadă de 2 ani și include pacienți cu adenocarcinom pancreatic potențial rezecabil. Un număr de 96 de pacienți au fost eligibili pentru analiză.

Rezultate: CRP, d-dimerii și nivelurile de fibrinogen au fost similare între cele două grupuri. Pe de altă parte, au existat diferențe semnificative statistic în ceea ce privește indicele nutrițional prognostic (PNI) și raportul neutrofile-limfocite (NLR).

Concluzii: Markerii inflamatori pot acționa ca un instrument suplimentar în prezicerea rezecabilității la pacienții cu adenocarcinom pancreatic.

Cuvinte cheie: pancreas, cancer, inflamație, rezecabilitate