

Carcinoamele ovariene: studiu al unei serii de paciente pe o perioadă de 8 ani cu analiză de supraviețuire

George Daniel Subtirelu¹, Andreea Steriu², Eugen Bratucu^{1,2}

¹1st General & Oncologic Surgery Department, Al. Trestioreanu Institute of Oncology, Bucharest, Romania

²Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: Acest studiu descrie o serie de cazuri de carcinom ovarian pe o perioadă de opt ani într-un singur centru de referință în funcție de stadializarea chirurgicală (pTNM) și procedura chirurgicală efectuată, și explorează caracteristicile cancerelor epitelului de suprafață ovarian (OSEC) în funcție de tipul histopatologic.

Material și Metode: obținerea de probabilități globale neajustate a supraviețuirii TFS pentru lotul cu un total de n=263 paciente la 12 luni și 60 luni. S-au făcut ajustări pentru: stadializare (clasificarea stadiilor pTNM), histotip și pentru pacientele cu status PSC. Histotipul HGSC a fost cel mai frecvent diagnosticat tip (63%). Pacientele cu status PSC arată un timp mediu de supraviețuire și probabilități de supraviețuire semnificativ mai mici (la 12 și la 60 de luni) decât toate celelalte cazuri.

Rezultate: în urma calculelor probabilitățile de supraviețuire la 12 luni pentru fiecare histotip sunt: CCC - 14%; RC - 15%; CS - 29%; HGSC - 46%; LGSC - 74%; CE - 79%; MC - 80% și BLT - 94%. La 60 de luni rezultatele sunt: RC și MC - 0%; CCC - 14%; HGSC - 16%; CS - 29%; LGSC - 62%; CE - 66%; și BLT - 94%. Timpul mediu de supraviețuire în funcție de histotipul înregistrat, este după cum urmează: CCC - 13 luni (IC 95% de la 0 la 26); RC - 16 luni (IC 95% de la 7 la 26), CS - 22 luni (IC 95% de la 1 la 42), HGSC - 32 luni (IC 95% de la 26 la 38); MC - 33 luni (IC 95% de la 16 la 50); BLT - 52 luni (IC 95% de la 47 la 56); CE - 71 luni (95% CI 56 până la 86); și LGSC - 74 luni (IC 95% de la 51 la 97). Durata mediană supraviețuire este de 26 de luni (IC95% 15 până la 37) și de 20 de luni atunci când BLT este exclus (IC95% CI 15 până la 25).

Concluzii: Aceste rezultate pot ghida cercetări ulterioare pentru patologia OSEC în funcție de histotipuri.

Cuvinte cheie: cancer al epitelului de suprafață ovarian, histo(patologic) tip, stadializare TNM, proceduri chirurgicale, analiza de supraviețuire