

Îndepărtarea laparoscopică a unui tricobezoar la adult

Serhii Savoliuk, Dmytro Zavertylenko, Andrii Dembitskyi, Illya Karabayev

Department of Emergency, Elective and Reconstructive Surgery, Shupyk National Healthcare University, Kyiv, Ukraine

Rezumat

Tricobezoarele sunt concreții de păr localizate la nivelul stomacului, asociate cu trichofagia și trichotilomania. În majoritatea cazurilor, acestea apar la femei tinere cu tulburări psihice concomitente. Tratamentul pentru această categorie de pacienți implică îndepărtarea chirurgicală a tricobezoarelor. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 24 de ani care s-a plâns de greață matinală, senzație de corp străin și dureri periodice de tip tracțiune în regiunea epigastrică. Palparea a evidențiat o masă străină care ocupa regiunea epigastrică. Pacienta a fost supusă tomografiei computerizate (CT) și esofago-gastroduodenoscopiei (EGD) pentru diagnosticul diferențial. Pe baza investigațiilor instrumentale, a fost stabilit diagnosticul de tricobezoar gastric. S-a efectuat gastrotomie laparoscopică pe peretele anterior al stomacului, cu extragerea tricobezoarului printr-un abord de mini-laparotomie de tip Pfannenstiel. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, iar pacienta a fost externată în a doua zi postoperatorie. Pentru prevenirea recidivei, s-au recomandat consult psihiatric și urmărire ambulatorie pe termen lung ca parte a tratamentului. Unicitatea acestui caz constă în prezența unui tricobezoar care a provocat un disconfort minim pe o perioadă îndelungată. Îndepărtarea laparoscopică a tricobezoarelor gastrice reprezintă o opțiune terapeutică eficientă datorită caracterului minim invaziv și recuperării postoperatorii rapide.

Cuvinte cheie: raport de caz, tricobezoar, îndepărtarea laparoscopică a tricobezoarului